

Cabinet du Docteur Luc POTY à Reims

D.U. ORTHODONTIE

4 rue Dumont d'Urville - 51100 REIMS - Tél. : 03 26 06 21 78

<http://dr-poty-luc.chirurgiens-dentistes.fr>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE _____

FICHE CONSEIL N° **1.03**

Rubrique : Qu'est-ce que l'orthodontie ?

Chaque enfant a droit à un bilan bucco-dentaire, à 6 ans puis à 9, pris en charge par la Sécurité Sociale.

L'adolescence est la période de traitement la plus fréquente

Au moindre doute, consultez ! S'il est trop tôt pour commencer un traitement, des visites de suivi vous seront proposées

A quel âge consulter un orthodontiste ?

Chez l'enfant, pour que le traitement orthodontique soit le plus efficace et le plus court possible, il est important d'intervenir au bon moment, ni trop tôt ni trop tard.

Très souvent c'est votre médecin traitant, le médecin scolaire ou votre dentiste qui vous conseillera de rencontrer un spécialiste, mais vous pouvez aussi le consulter de vous-même si vous soupçonnez un risque particulier.

Un traitement d'orthodontie est envisageable dès que la première molaire permanente est apparue, parfois même lorsqu'il n'y a que des dents de lait. C'est vers 6-8 ans que sont le plus souvent dépistées les malpositions maxillo-faciales (mâchoires trop courtes ou trop longues, trop larges ou trop étroites).

Toutefois, à partir de l'évolution des quatre incisives du haut et du bas, il est important d'être vigilant.

Traitements orthodontiques précoces

Vers 3-4 ans, les traitements sont rares. Mais si votre enfant présente déjà un gros décalage entre les deux mâchoires, il pourra être pris en charge dès cet âge-là. Le traitement se fera à l'aide de petits appareils amovibles. C'est vers 6-8 ans que les décalages entre les deux mâchoires sont le plus souvent dépistés. A cet âge, la correction se fait également à l'aide d'appareils amovibles. On peut aussi faire du pilotage (extraire certaines dents) pour permettre aux dents définitives d'avoir la place de pousser correctement.

Traitements des adolescents

La plupart des traitements orthodontiques se font à l'adolescence. Avant la puberté, il est encore possible de jouer sur la croissance des mâchoires, alors qu'après, seule la position des dents peut être modifiée. Pour modifier la position des dents, on utilise le plus souvent des bagues collées sur les dents.

A lire aussi : [A chaque âge son traitement](#)

Traitement des adultes

Les adultes peuvent bénéficier de traitements orthodontiques pour réaligner leurs dents. En revanche, s'ils présentent un décalage de croissance des mâchoires, le traitement devra être chirurgical (traitement orthognatique).


Voir aussi : [L'orthodontie de l'adulte](#)

Observez votre enfant : quelques signes peuvent vous alerter

- Un décalage important entre les dents supérieures et les dents inférieures
- Une dent de lait qui ne tombe pas spontanément
- Des incisives supérieures en avant (dents de lapin)
- Un mauvais contact entre la dent et la gencive
- Une bouche petite, des maxillaires étroits
- Il respire la bouche ouverte
- Il ronfle la nuit
- Il a un défaut de prononciation

Souvenez-vous de certains détails :

- Il n'avait pas d'espace entre ses dents de lait
- Il a sucé son pouce au-delà de l'âge de six ans



Nos Conseils

- Un diagnostic et un traitement précoces peuvent éviter un traitement plus long et compliqué à l'adolescence.
- Si vous soupçonnez un risque particulier chez votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre chirurgien-dentiste ou à consulter un orthodontiste
- Il n'est pas nécessaire d'attendre la chute de toutes les dents de lait pour consulter